

Виды наркотиков и их воздействие

От последствий употребления наркотиков в России ежегодно умирает более 70 000 человек

Вред для окружающих*

- Психологическая травма
- Ущерб для окружающей среды
- Неблагоприятная обстановка в семье
- Проблемы международного масштаба
- Экономические издержки
- Падение репутации общества

Вред для употребляющего*

- Смерть
- Поражение организма
- Наркотическая зависимость
- Ухудшение умственной деятельности
- Утрата материальных благ
- Разрушение взаимоотношений



Время действия наркотика

Смертность*

*Результаты исследования, опубликованные в журнале «The Lancet» Drug harms in the UK: a multicriteria decision analysis



Заболевания, вызванные употреблением наркотика

ПСИХОДЕЛИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА

ЛСД, психоцибин, МДМА

- расширение зрачков
- нарушение сна
- дрожание рук
- сухость кожи
- утрата самоконтроля
- депрессия

2-12 часов



Аритмия

Разрушение мозговой ткани, галлюцинации

Цирроз печени

Почекная недостаточность

Психозы, шизофрения



КАНАБИНОИДЫ

Марихуана, гашиш, гашишное масло

- эйфория
- разговорчивость
- сильный голод и жажды
- покраснение глаз
- обострённое восприятие цвета и звуков

2-3 часа



Нарушение памяти

Паранойя

Бронхит, рак лёгких



КУРИТЕЛЬНЫЕ СМЕСИ

Спайс, микс и другие синтетические каннабиноиды

- беспричинный хохот
- неспособность сосредоточиться
- нарушение восприятия мира

до 6 часов



Психические расстройства

Бронхит, рак лёгких



КОКАИН

Кокайн, крек и другие производные листьев коки

- расширение зрачков
- эйфория
- учащённый пульс
- потливость
- чувство тревоги
- бессонница

2-3 часа



Аритмия, риск инфаркта

Галлюцинации

Поражение слизистой

Глухота



АМФЕТАМИН

Амфетамин, первитин, эфедрон, метамфетамин

- расширение зрачков
- эйфория
- гиперактивность
- болтливость
- отсутствие чувства голода
- вспышчивость

2-12 часов



Риск инсульта

Поражение юдом и красным фосфором

Риск инфаркта

Ухудшение зрения

Нервное истощение

Почекная недостаточность



ОПИАТЫ

Героин, дезоморфин, опий, метадон, маковая соломка

- «растянутая» речь
- стремление к уединению
- бледность кожи
- узкий зрачок
- отсутствие аппетита
- снижение иммунитета

3-6 часов



Почекная недостаточность

Пародонтоз

Разрушение печени

Импотенция

Заболевания вен

Пневмония